



THE WORLD BANK  
IBRD · IDA | WORLD BANK GROUP



Funded by  
The European Union

අධි ඝනත්ව දෙපෙළි ක්‍රමයට

# වරක්

## වගා කරමු.



### තුවාන් පාලනය

NURSERY MANAGEMENT

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය,  
කෘෂි අංශ නවීකරණ ව්‍යාපෘතිය



# 01. තවත් පාලනය

1.1 තවත් පාලනය

1.2 තවත් මාධ්‍ය සකස් කරන ආකාරය



අධි ඝනත්ව දෛපේළි ක්‍රමයට

# විට්

## වගා කරමු

---



ඔබ දන්නවාද අපේ

### විට්

අවශ්‍යතාව සපුරා ගනු වස් විශාල විදේශ විනිමයක් වැය කරමින් පිරිසට වලින් මිරිස ආනයනය කරන බව

මේ විශාල මුදල් ප්‍රමාණය රට තුළ ඉතිරි කර ගන්නට අපට හැකි ද?

---

## 1.1 තවාන් පාලනය

**නිරෝගී දිරිමත් තවාන් පැළයක් තුළින් නිරෝගී ගුණාත්මක වගාවක් බිහි කරගත හැකිය.**



### තවාන් තැටි හා කොකෝ පෙලටිස් භාවිතයෙන් (කොහුවත් කැට)

නිරෝගී හා දිරිමත් මිරිස් පැළයක් ලබා ගැනීම සඳහා වඩාත් සුදුසුම තවාන් ක්‍රමය වන්නේ කොකෝ පෙලටි භාවිතා කිරීම තුළින් තවාන් හඩත්තු කිරීමයි. මෙහි ඇති විශේෂ වාසි වන්නේ ශාක පෝෂක එකතු කිරීමක් අවශ්‍ය නොවීමත්, පොලිතින් වැනි පාරිසරික අපද්‍රව්‍ය කේන්ද්‍රය තුළට නොපැමිණීමත් සේම තවානේදී වැළඳෙන රෝගවලින් ආරක්ෂා වීමත්ය.



01

## මැස්සක් මත තවාන Elevated Nursery

තවාන තැටි රැඳවීම සඳහා සරල  
මැස්සක් මත සකස් කළ ආරක්ෂිත  
ගෘහයක් භාවිතා කරන්න..

මෙමගින්,  
තවාන හැසිරවීම හා නිරීක්ෂණය  
පහසු වීම,  
රෝග, පළිබෝධ වැළැඳීමේ අවධානම  
අඩු කර ගත හැකි වීම වගේම  
සත්ත්ව හානි ද වළක්වා ගත හැකිය.





## 1.2 තවාන මාධ්‍ය සකස් කරන ආකාරය (කොකෝ පෙලට් භාවිතා නොකරන්නේ නම්)

කොහුඹන්, කරදහයිසා, වැලි, කොම්පෝස්ට් හා මතුපිට පස් සමාන ප්‍රමාණ වලින් මිශ්‍ර කර තවාන මිශ්‍රණය සකස් කර ගනු ලබයි.



- මෙම මිශ්‍රණයෙන් තවාන තැටි පුරවා ගත යුතුය.
- මිරිස් බීජ තවාන දැමීමට පෙර දින උදෙසේ පලයේ පොඟවන්න.

01



- සවස දිය බේරෙන්නට තබා බීජ ප්‍රතිකාරකයක් සමඟ මිශ්‍ර කර පැය 12ක් තබන්න.



- පසුදා උදෑසන දිලීර නාශකයක් මිශ්‍ර කර මඳ පවහේ වියළා ගන්න.

- ඉන්පසු සෙ.මී 1/2 ගැඹුරින් තවාන් තැටි වල බීජ සිටුවා ගන්න.

- ඉන් පසු තවාන් මිශ්‍රනයෙන් වසා පිදුරු වසුනකින් ආවරණය කරන්න.



- ඉන්පසු දිලීර නාශක දියරයකින් තවාන හොඳින් තෙමන්න.


- ආරක්ෂිත ගෘහයක් තුළ මේ තවාන් තැටි තබන්න.

- දින 4කදී පමණ මිරිස් බීජ පැලවන විට පිදුරු වසුන ප්‍රවේශමෙන් ඉවත් කරන්න.



- දින 6 කදී පමණ තවාන සුර්යාලෝකයට නිරාවරණය කිරීම ආරම්භ කරන අතර උදෑසන 8.00 පමණ වන තෙක් තවාන් තැටිවලට සුර්යාලෝකය ලබා දිය යුතුය.

01



- දින 7,8,9 වන විට දිනකට පැය භාගයක් පමණ සූර්යාලෝකයට හිරාවරණය කරන්න.
- දින 12කට පසු පස්වරු 12 සිට පස්වරු 2.00 අතර කාලය සෙවණ සැපයිය යුතු අතර ඉතිරි කාලය සූර්යාලෝකයට හිරාවරණය කළ යුතුය.
- සූර්යාලෝකයට හිරාවරණය වන විට තවත් පැළ දැඩි වන අතර දින 12 සිට 28 දක්වා පැළ කේන්‍රයේ සිටුවිය හැක.
- M I C H Hybrid 01 ප්‍රභේදය සීඝ්‍ර වර්ධනයක් සහිත ය
- දින 28කට පෙර අභිචාර්යයෙන් පැළ කේන්‍රයේ සිටුවිය යුතුය, නැතහොත් පැළවල වර්ධනය බාල වේ.





අධි ඝනත්ව දෛපේළි ක්‍රමයට

**වරක්**

**වගා කරමු.**

### ප්‍රකාශන කට්ටලය

1. තවාන් පාලනය
2. අධි ගණත්ව දෛපේළි ක්‍රමයට මිරිස් වගා කරමු.
3. අධි ගණත්ව දෛපේළි ක්‍රමයට මිරිස් වගා කරමු.
4. කෞතු සනීපාරක්‍ෂාව හා රෝග පළිබෝධ පාලනය
5. අස්වනු හෙළීම හා සැකසීම

අධි ඝනත්ව දෙපේළි ක්‍රමයට

වරක්

වගා කරමු.

---



නවීන් පාලනය

NURSERY MANAGEMENT